



Informasjon fra Plantevernprosjektet:

«Rådgivning innen integrert plantevern i veksthus» pr 22. september 2014

*Integrert plantevern = bekjempelse av skadegjører med alle tilgjengelige metoder (biologiske - og kjemiske plantevernmidler, valg av sterke plantesorter, optimal dyrking, bruk av limfeller m.m.).

Se opp for agurkbladlus i 2014

Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus

Det er registrert angrep av agurkbladlus i agurk i år. Følg derfor med på planter og limfeller (vinga bladlus) og se etter agurkbladlus i ditt veksthus. Agurkbladlus angriper både blomster og agurk, men kan gjøre spesielt stor skade i agurk.



Agurkbladlus. Foto: A. Smith Eriksen

For å velge rett nyttegyr eller plantevernmidler, må du sjekke om det er agurkbladlus du har. Sikre kjennetegn på agurkbladlus er at:

- antennene er kortere enn kroppen,
- ryggrørene er svarte og
- unge bladlus er lysegrønne og voksen bladlus er mørkegrønne

Bekjempelse

I agurk anbefales forebyggende utsett av snyltevepsen *Aphidius colemani*, dose 0,5-1 stk/ m^2 hver uke. Ved angrep økes dosene av snylteveps til minst 2 stk/ m^2 . I tillegg til snylteveps kan det også settes ut gallmygg (*Aphydoletes aphidimyza*) ved angrep av agurkbladlus.

Ved angrep av agurkbladlus, kan det sprøytes med Movento eller Confidor. (Pirimor virker IKKE på agurkbladlus).

Movento er ordinært godkjent i agurk og på of-label i prydplanter i veksthus. Dersom du skal bruke Movento i prydplanter, så ta kontakt med NGF ved Ronny Berdinesen ronny@gartner forbundet.no for å få tilsendt of-label etikett.

Confidor og Movento har 3 dagers behandlingsfrist i agurk.

Sprøyting med Confidor er skadelig for nyttegyr og har ca. 2 ukers ettevirkning. Movento er skånsom for bladlus snylteveps, men skadelig for rovmidd.

Ta kontakt for mer info om bekjempelse av agurkbladlus: annichen.smith.eriksen@nlr.no